

SUOSITUKSET PÄIVÄHOITOLASTEN POISSAOLON VÄHIMMÄISAJAKSI TARTTUVIEN TAUTIEN YHTEYDESSÄ

PERUSPERIAATTEET

1. HENGITYSTIEINFEKTIOT

- Usein ryhmässä samanaikaisesti paljon oireettomia infektoituneita lapsia; oireisia kuumeettomia lapsia ei yleensä ole tarvetta eristää
- Oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolon tarpeen
- Antibioottihoido esim. korvatulehduksen yhteydessä ei sinänsä edellytä poissaoloa

2. SUOLISTOINFEKTIOT

- Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona, kunnes oireet loppuvat

3. SILMÄTULEHDUKSET (KONJUNKTIIVIT)

- Lasta, jonka silmä rähmii, ei tarvitse välittömästi poistaa hoidosta tartunnan vaaran vuoksi
- Oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolon tarpeen

TAPAUSKOHTAISET OHJEET

YSKÄ-NUHAKUUME Kun kuume on ohi, ja mikäli yleistila on hyvä. Yskä ja nuha eivät ole esteenä päivähoitoon tuomiselle.

KORVATULEHDUS Ei poissaoloa, yleistila ratkaisee.

RÄHMIVÄ SILMÄ Ei poissaoloa. Oireiden voimakkuus ratkaisee poissaolon tarpeen.

HERPES-SUUTULEHDUS

Ei poissaoloa.

TAVALLINEN PIKKULASTEN RIPULI

Kuumeen, vatsavaivojen ja ripulivaiheen ajan.

SALMONELLA Poissaolo vähintään viikon ajaksi oireiden alkamisajasta ja poissaolo jatkuu, kunnes oireet ovat olleet poissa vähintään 24 tuntia.

PARASIITTITAUDIT Mikäli lapsi on oireeton, ei poissaoloa.

VESIROKKO Ihottuman alkamisesta siihen saakka, kunnes ruvet ovat kuivuneet.

ENTEROROKKO	Ei poissaoloa.
PARVOROKKO	Ei poissaoloa.
MÄRKÄRUPI	1 – 2 vuorokautta lääkehoidon aloittamisesta.
VAUVAROKKO (3 PÄIVÄN KUUME)	
	Kun kuume on ohi, yleistila ratkaisee.
HINKUYSKÄ	5 vuorokautta erytromysiinihoidon aloittamisesta.
ANGIINA JA TULIROKKO	
	24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta.
SYYYHY TAI TÄIT	Hoidon ajaksi.
ONTELOSYYLÄ	Ei poissaoloa.
KIHOMADOT	Ei poissaoloa.

Erittäin tärkeää tehostettu käsihygienia.

Tapauskohtaisista ohjeista huolimatta hoitava lääkäri ratkaisee poissaolon pituuden.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa mainittuja selvityksiä sairaan lapsen hoitotarpeesta kirjoittavat terveydenhoitajat, vastaanottojen sairaanhoitajat ja tarvittaessa terveyskeskuslääkärit sekä antavat lisäohjeita hoidon järjestämisestä. Vastaanottokäynti tarpeellinen lapsen tilan arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden antamisen vuoksi.

LÄÄKKEIDEN SÄILYTTÄMISESTÄ

Kaikki lääkkeet säilytetään lukitussa lääkekaapissa tai jääkaapissa. Viileän (+8 – +15°C) tai kylmän (+2 – +8°) säilytyksen vaativat lääkkeet säilytetään jääkaapissa, jossa tulee olla lämpömittari. Jääkaapin lämpötila ei saa laskea alle +2°C.

Jouni Kaleva
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

JAKELU	lääkärit	osastot
	neuvolat	fysioterapiat
	vastaanotot	laboratoriot
	kouluterveydenhoitajat	röntgenit
	kotisairaanhoidot	työterveyshuollot

TIEDOKSI	jäsenkuntien sosiaalitoimi
	Reijo Räsänen
	Jukka Viinikka
	Riitta Räsänen